

Gegevens patiënt

Naam: _____ Pin nr (intern): _____
 Geb.datum: _____ BSN (extern): _____
 Adres: _____ Geslacht: M / V
 Postcode/Plaats: _____

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (arts): _____ Afdeling: _____
 Naam ziekenhuis: _____ Telefoonnr/sein: _____
 Adres: _____ Fax: _____
 Postcode/Plaats: _____ Projectnr.: _____

Toelichting bij de aanvraag / co-medicatie

Gegevens te bepalen geneesmiddel(en)

Preparaat	Dosering	i.v./oraal	Sinds	Tijdstip en datum laatste toediening
..... d.d. mg : op / / 20
..... d.d. mg : op / / 20

DIT BLOK ALTIJD INVULLEN!

Afnamegegevens

Afnamedatum: / / 20

Afnametijd: :

Gewicht patient: kg



Reden van aanvraag

- Controle, klinisch goed ingesteld
- Vermoeden van therapie-ontrouw
- Vermoeden van subtherapie
- Vermoeden van overdosering
- Vermoeden van intoxicatie
- Vermoeden van interactie met _____
- _____

CITO alleen i.o.m. apotheker via (024) 361 41 63

Codes afnamematerialen z.o.z.

Antibiotica p4/k4

- Amikacine dal p4
- Amikacine top p4
- Ceftazidim k4
- Ciprofloxacine k4
- Co-trimoxazol (sulfamethoxazol/trimethoprim) k4
- Flucloxacilline k4
- Gentamicine dal p4
- Gentamicine top p4
- Piperacilline Tazobactam k4
- Tobramycine dal p4
- Tobramycine top p4
- Trimethoprim k4
- Vancomycine dal p4
- Vancomycine top p4
- Vancomycine continu p4
- Moxifloxacine p4
- Levofloxacine p4
- Linezolid p4

Tijdstippen bloedafname en start infuus altijd vermelden!

- Dosering: mg
- Interval: uur
- Tijdstip start infuus: uur
- Bloedafname: dal: uur
- top: uur
- anders: uur

Antivirale middelen k4/p4

- Aciclovir p4
- Ganciclovir p4
- Ribavirine k4

Oncolytica k4

- Abiraterone (aanleveren op ijs)*
- Enzalutamide
- Etoposide k4/p4
- Methotrexaat T = uur (p4) altijd aanmelden!
- _____
- Imatinib
- Sunitinib + desethylsunitinib
- Pazopanib

Anti-epileptica p4

- Carbamazepine
- Fenobarbital
- Fenytoine
- Vrije concentratie fenytoine
- Valproïnezuur
- Vrije concentratie valproïnezuur

Antiretrovirale middelen k4/p4

- Abacavir k4
- Atazanavir k4
- Cobicistat k4
- Darunavir k4
- Didanosine k4
- Dolutegravir
- (aanleveren op ijs)* k4
- Efavirenz k4
- Elvitegravir k4
- Emtricitabine k4
- Etravirine k4
- Fosamprenavir k4
- Indinavir k4
- Lamivudine k4
- Lopinavir k4
- Nevirapine k4
- Raltegravir k4
- Rilpivirine k4
- Saquinavir k4
- Tenofovir k4
- Tipranavir k4
- Zidovudine k4

Tuberculose-middelen p4

Afnemen of op 2 uur of op 2, 4 en 6 uur na toedienen (farmacokinetische curve, z.o.z.)

- Ethambutol
- Isoniazide (aanleveren op ijs)*
- Moxifloxacine
- Pyrazinamide
- Rifampicine (aanleveren op ijs)*
- Levofloxacine
- Linezolid
- Rifabutin

Antimycotica p4

- Anidulafungine (aanleveren op ijs)*
- Caspofungine (aanleveren op ijs)*
- Fluconazol
- Flucytosine dal
- Flucytosine top
- Itraconazol
- Micafungine
- Posaconazol
- Voriconazol

Immunosuppressiva k4

- Mycofenolzuur

Opmerking: op droogijs aanleveren

Diversen p4

- Coffeïne
- Digoxine
- Theofylline
- Thiopental/Pentobarbital

* Overleg met laboratorium apotheek over transportcondities

